



DR. JOSÉ RAMÓN VELÁSQUEZ

CIRUGÍA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA

MPPS: 74797

📞 0212-985.6608

📞 +58 424 366 1386

📷 Drjoseramoncplastica

🌐 www.drjoseramonvelasquez.com

📍 Centro Financiero Madrid .Piso 13 Oficina 13-07 Las Mercedes Caracas - Venezuela

Consentimiento Informado MAMOPLASTIA

Fecha de Obtención del CI: _____

Historia: _____

Hipótesis Diagnóstica: _____

Médico (Primer Nombre y Dos Apellidos): _____

Paciente: _____ C. I.: _____

Representante Legal (Si corresponde): _____

Yo, _____ de _____ años de edad, Cédula de
identidad N° _____, con domicilio en
_____ actuando en mi

propio nombre, **DECLARO:** Que el Dr. José Ramón Velásquez V. 17. 846.677 especialista en
Cirugía Plástica, con más de 12 años de experiencia en la profesión, N.º de Colegio 30.339,
me ha explicado la importancia de proceder, en mi condición, y diagnóstico, el cual arrojó como
resultado: _____

_____, que he leído y comprendido
la información que me ha entregado la cual se reproduce a continuación, según los rubros de
exigencia médica, a saber:

Firma Paciente _____

OBJETIVOS: La mamoplastía de aumento es una operación quirúrgica destinada a aumentar el tamaño de las mamas por una serie de motivos posibles: Mejorar el contorno corporal de la mujer que considera demasiado pequeño el tamaño de sus mamas. Corregir una pérdida de volumen mamario. Equilibrar el tamaño de las mamas cuando exista una diferencia significativa entre ellas. En algunos casos, como técnica reconstructiva.

CARACTERÍSTICAS: El aumento de la mama se consigue implantando una prótesis ya sea detrás del tejido mamario o debajo de los músculos pectorales. Las incisiones se realizan de manera que resulten lo más invisibles que sea posible. El método de implantación y posición de las prótesis es un aspecto importante a convenir siguiendo las recomendaciones de su cirujano plástico. La forma y el tamaño de las mamas previas a la cirugía, pueden influir tanto en el tratamiento recomendado como en el resultado final. Si las mamas no tienen el mismo tamaño o forma antes de la cirugía, es poco probable que sean completamente simétricas después. Existen varios tipos de implantes: rellenos de gel silicona; rellenos de suero fisiológico, de superficie lisa, texturizada, de forma redonda o anatómica, etc. Por lo tanto usted debe conversar y llegar a acuerdo con su cirujano plástico acerca de cuál es la que, en su caso, puede resultar estéticamente mejor. La mamoplastía de aumento es una operación plástica electiva como alternativa.

RIESGOS: Cualquier procedimiento quirúrgico entraña un cierto grado de riesgo. Por lo tanto, es necesario que usted sepa cuáles son los riesgos de someterse a una mamoplastía de aumento, intervención plástica electiva.

- Hemorragia: Es posible, aunque infrecuente, que pueda producirse un sangramiento durante su operación o después de la cirugía. Si se produce un sangramiento después de su operación podría llegar a ser necesaria una exploración local para hemostasia (control de sangramiento). Por lo anterior, es muy importante que usted no tome aspirina o similares o antiinflamatorios desde 10 días antes de su operación, ya que ello aumenta significativamente el riesgo de sangramiento.
- Infección: Si bien es posible, es infrecuente y su riesgo se reduce con el uso de antibioprofilaxis. Si se produce infección el mayor problema es que llegue a ser necesario retirar una prótesis.

Firma Paciente _____

- **Contractura capsular:** El tejido cicatrizal que se forma internamente alrededor del implante puede contraerse y hacer que la prótesis se haga redonda, firme y posiblemente dolorosa. La dureza excesiva de las mamas puede ocurrir al poco tiempo de la cirugía o al cabo de años. Puede esperarse que la incidencia de la contractura capsular sintomática aumente con el tiempo. Esta contractura puede ocurrir en un lado, en los dos o en ninguno y su tratamiento puede requerir cirugía, cambio del implante o retirada del mismo.
- **Cambios en la sensibilidad del pezón y la piel:** Después de la cirugía y durante un tiempo las mamas quedan habitualmente sensibles y no es raro que se produzca temporalmente un cambio de sensibilidad del pezón, que al cabo de unas semanas desaparece.
- **Cicatriz cutánea:** La cicatrización excesiva es infrecuente. En algunos casos pueden producirse cicatrices anormales o de color diferente pudiendo hacer necesaria una operación correctora posterior.
- **Implantes:** Los implantes mamarios, al igual que otros dispositivos médicos pueden fallar, pueden romperse o tener escapes. Las prótesis tienen una vida limitada y es necesario que usted esté informada que eventualmente en el tiempo se requiera un recambio.
- **Extrusión del implante:** La falta de adecuada cobertura tisular o una infección puede dar como complicación la exposición y extrusión del implante. Si esto se produce, la prótesis debe ser retirada.
- **Arrugas y pliegues en la piel:** Pueden existir pliegues en el implante, visibles y palpables.
- **Calcificaciones:** Pueden producirse depósitos de calcio en el tejido que rodea la prótesis lo que producirá aumento de consistencia y dolor.
- **Asimetría:** Cierta grado de asimetría mamaria ocurre de forma natural en la mayoría de las mujeres, también pueden ocurrir diferencias en la forma de la mama o el pezón, tamaño o simetría tras la cirugía. Podría necesitarse cirugía adicional para revisar una asimetría mamaria.

Firma Paciente _____

- OTRAS CONSIDERACIONES Mamografías: Usted tiene que saber que los implantes mamarios puede hacer más difícil la realización de mamografías dificultándose así la detección oportuna de un cáncer precoz. Además, la compresión de la mama durante mamografía podría causar la rotura del implante. Por tanto, de efectuarse mamografías es necesario que se informe de ello al momento del examen o bien para reemplazar la mamografía por otro examen (ej.: resonancia magnética).
- Embarazo y lactancia: No existe evidencia suficiente que demuestre que el implante mamario pueda producir algún riesgo o peligro para la mujer embarazada. Actividades o trabajos de riesgo: Las actividades o trabajos que representen un riesgo de recibir un traumatismo mamario podrían dañar los implantes. Enfermedades o cáncer de mama: La literatura médica actual no demuestra riesgos de incremento de enfermedades mamarias o cáncer de mama en mujeres portadoras de prótesis mamarias por motivo estético o reconstructivo.

“Las primeras 2 consultas de pos operatorio son exoneradas, si se requieren otras consultas con el Dr. José Ramón Velásquez las mismas tendrán un costo de 40\$ c/u”

Por otro lado, estoy de acuerdo y acepto, si al momento del acto quirúrgico, surgiera algún imprevisto, **el equipo médico podrá variar la técnica quirúrgica programada, o modificar el volumen seleccionado conforme a mi contextura y bienestar, pues mi salud es lo primero.** Así mismo, he entendido y acepto que durante el procedimiento/tratamiento **se podrán realizar fotografías o grabar imágenes que luego se conservarán y se podrán transmitir con fines científicos y/o de docencia,** utilizar en sesiones clínicas, juntas facultativas, conferencias, congresos, publicaciones médicas y actos científicos, sin que en las mismas figure mi identidad. **Manifiesto además que el Dr. José Ramón Velásquez, no me ha GARANTIZADO RESULTADO, el resultado que puede ser obtenido, bajo cada uno de los aspectos anteriormente enumerados.** También comprendo que, para revocar el presente consentimiento debo participarlo por lo menos con 3 días hábiles a la suscripción del mismo.

En tales condiciones **CONSIENTO** que se me efectúe el procedimiento de **MAMOPLASTÍA DE AUMENTO.**

Firma Médico

Firma Paciente

Firma Acompañante

